

CENTRO DE IMUNIZAÇÃO

| Idade | Vacinas |
|------------|---|
| Ao nascer | BCG (Tuberculose), Hepatite B |
| 2 meses | Hepatite B Poliomielite (Salk) Triplíce Bacteriana (DTP / DTP Acelular) Haemophilus infl. tipo b Rotavírus Pneumocócica conjugada |
| 3 meses | Meningocócica B / Meningocócica ACWY |
| 4 meses | Poliomielite (Salk) Triplíce Bacteriana (DTP / DTP Acelular) Haemophilus infl. tipo b Rotavírus Pneumocócica conjugada |
| 5 meses | Meningocócica B / Meningocócica ACWY |
| 6 meses | Hepatite B Poliomielite (Sabin/Salk) Triplíce Bacteriana (DTP / DTP Acelular) Haemophilus infl. tipo b Pneumocócica conjugada Rotavírus* Influenza (Gripe)* * |
| 7 meses | Meningocócica B / Meningocócica ACWY |
| 12 meses | Triplíce Viral (SCR - Sarampo - Caxumba - Rubéola) Varicela (Catapora) Hepatite A Meningocócica ACWY |
| 14 meses | Meningocócica B |
| 15 meses | Poliomielite (Sabin/Salk) Triplíce Bacteriana (DTP / DTP Acelular) Haemophilus infl. tipo B Pneumocócica conjugada |
| 18 meses | Hepatite A / Varicela (Catapora) Triplíce Viral (SCR - Sarampo - Caxumba - Rubéola) |
| 4 a 6 anos | Poliomielite (Sabin/Salk) Triplíce Bacteriana (DTP / DTP Acelular) Meningocócica ACWY * * * |
| 9 anos | HPV (Papiloma Vírus Humano) |
| 15 anos | Triplíce Bacteriana Acelular do tipo adulto (dTpa) |

* Conforme fabricante / ** Dose anual / *** Repetir a dose a cada 5 anos.
Fonte: calendário vacinal adaptado da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIIm).

Responsável Técnico - Dr. Francisco Giannattasio - CREMESP 42.825

Cod. 001/A Abril 2017

CENTRO DE IMUNIZAÇÃO

CAROS PAIS,

Nós do Centro de Imunização Santa Joana gostaríamos de parabenizá-los pela chegada de seu bebê.

Além de seu colo e leite materno, ele precisa também de atenção e proteção contra várias doenças. Uma das melhores maneiras de proteger seu filho é através da vacinação. Vaciná-lo é um ato de amor; e seu bebê já pode ser imunizado ainda na maternidade, contra a Hepatite B e Tuberculose, com todo conforto e segurança.

Existem vacinas indicadas para cada etapa da vida: recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos, gestantes, puérperas e pessoas acima de 60 anos. Algumas vezes, imunizar os adolescentes e adultos que convivem com o recém-nascido é também uma maneira de protegê-lo.

Na maioria dos casos graves de Coqueluche na criança, foram os adultos os responsáveis pela transmissão da doença para o bebê. A vacinação dos pais de recém-nascidos contra a Coqueluche tem se demonstrado uma excelente estratégia na prevenção dessa doença.

Nós do Centro de Imunização Santa Joana oferecemos mais esse serviço a vocês.

LEMBRE-SE: PREVENIR É SEMPRE O MELHOR REMÉDIO!

Para mais informações no hospital, disque o ramal 6066

Centro de Imunização Santa Joana
Av. República do Líbano, 900 – CEP 04502-001
Tels.: (11) 3887-6950 e 3052-5031
www.vacinasantaJoana.com.br
faleconosco@vacinasantaJoana.com.br